

ატმის დაცვის სქემა



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



ფოთლოვანი მკვებავი

I

მოსვენების
პერიოდი

ფარიანები და სხვა
მავნებლების
მოზამთრე სტადიები

II

კვირთის
დაბერვა

ატმის სიხუჭუჭე

III

კვირთის
გახსნა

ატმის სიხუჭუჭე,
მონილიობი
კლასტეროსპოროზი

IV

ყვავილობის
დასაწყისი

მონილიობი

V

ყვავილობის
დასასრული

მონილიობი, ნაცარი,
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

ქემოლი ეპ,
15ლ/ჰა

რამინი 30 წდგრ
7კგ/ჰა

რიტმუსი ეპ
0.5ლ/ჰა

დოდინ ფლო
1.5ლ/ჰა

ბორო პრობალტა
2.5ლ/ჰა

ავალონი
0.8ლ/ჰა

პირიქამი
1.5ლ/ჰა

ა-მიქსურ
ალგასი 1.5ლ/ჰა

რიტმუსი
0.5ლ/ჰა

განგო 0.5ლ/ჰა

ფოსბელ 80
2კგ/ჰა

VI

თხილის ზომის
ნაყოფი

ნაცარი, მონილიობი
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

VII

კაკლის ზომის
ნაყოფი

ნაცარი, მონილიობი,
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

VIII

კურკის
გამაგრების ფაზა

ნაცარი, მონილიობი
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

IX

ნაყოფების
დამსხვილება

ნაცარი, მონილიობი
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

X

სიმწიფის
დასაწყისი

ნაცარი, მონილიობი
კლასტეროსპოროზი
ნაყოფქამიები, ბუგრები

ტეპი 0.3კგ/ჰა

დოდინ ფლო
1.5ლ/ჰა

ა-მიქსურ Ca
კლიუსი 2.5ლ/ჰა

პანკარტი
0.4კგ/ჰა

ავალონი
0.8ლ/ჰა

პირიქამი
1.5ლ/ჰა

ბარმექტინი
0.7/ჰა

განგო 0.3ლ/ჰა

კლატინ კაკტანი
3კგ/ჰა

პანკარტი
0.4კგ/ჰა

ფოსბელ კლიუსი
2.5კგ/ჰა

ა-მიქსურ Ca
კლიუსი 2.5ლ/ჰა

პირიქამი 1ლ/ჰა

კლატინ კაკტანი
3კგ/ჰა

გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს გოგად სარეკომენდაციო ხასიათს. დაავადებების და მავნებლების გავრცელების გათვალისწინებით შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს წამლობების დოზირება და ჯერადობა. **დავკიკავშირდით: +995 598 53 44 00**