

ვაზის დაცვის სქემა



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



მიმწებებელი

I

კვირების
გაგება

ჭრაქი,
სიდამპლე

დოდინ ფლო
1ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.2ლ/ჰა

II

3-5 ფოთლის
ფაზა

ტკიპები, ფარიანები
ბაქტერიული
დამწვრობა, ჭრაქი

ბერმეტიინი
0.2ლ/ჰა

ფოსბალ 80
2კგ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.2ლ/ჰა

III

8-10 ფოთლის
ფაზა

ჭრაქი, ნაცარი,
ფომოფსისი

რამინი 30 წდგრ
2კგ/ჰა

გერმატი
0.5ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.2ლ/ჰა

IV

ყვავილობის
დასაწყისი 20%

ჭრაქი, ნაცარი

რითმუსი ეკ
0.4ლ/ჰა

ფოსბალ ექსტრა 2კგ/ჰა
განგო ეკ 0.2ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

V

ყვავილობის
დასასრული 80%

ჭრაქი, ნაცარი,
ნაცრისფერი
სიდამპლე

აპალონი
0.5ლ/ჰა

ფოსბალ 80
2.5კგ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

VI

გამოსორბვლა

ჭრაქი, ნაცარი,
ფომოფსისი, შავი
სიდამპლე,
ყურძნის ჭია

განგო ეკ 0.2ლ/ჰა

ფოსბალ ექსტრა 2კგ/ჰა
გერმატი 0.5ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

VII

ისპრიმობა

ჭრაქი, ნაცარი,
ანთრაქნოზი,
ყურძნის ჭია

კინაგოლი ვლ/ჰა
რამინი 30 წდგრ 2კგ/ჰა

აპალონი 0.8ლ/ჰა
მორფეო 0.5ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

VIII

მთვანის შეკვრა

ჭრაქი, ნაცარი,
ფომოფსისი, შავი
სიდამპლე, შავი
სილაქავე

პანკარტი
0.25კგ/ჰა

ფოსბალ ექსტრა 2კგ/ჰა
გერმატი 0.5ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

IX

სრული ნაყოფი

ჭრაქი, ნაცარი,
ანთრაქნოზი

რამინი 30 წდგრ
2კგ/ჰა

კინაგოლი ვლ/ჰა
მორფეო 0.4ლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

X

შეთვალვა

ჭრაქი, ნაცარი,
ანთრაქნოზი

რამინი 30 წდგრ
2კგ/ჰა

კინაგოლი
ვლ/ჰა

კლუვიუმა ტოპი
0.4ლ/ჰა

გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს ზოგად სარეკომენდაციო ხასიათს. დაავადებების და მავნებლების გავრცელების გათვალისწინებით შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს ნაწილობრივი დოზირება და ჯერადობა. **დავნიკავშირდით: +995 598 53 44 00**